

対象疾患名：胃がん

レジメン名：HER + カペシタビン療法

1コースの日数：21日

| | | |
|----|---|-------------|
| 備考 | BSA < 1.36 m ² | : 2400 mg/日 |
| | 1.36 m ² ≤ BSA < 1.66 m ² | : 3000 mg/日 |
| | 1.66 m ² ≤ BSA < 1.96 m ² | : 3600 mg/日 |
| | BSA ≥ 1.96 m ² | : 4200 mg/日 |

レジメン内容

| Rp | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 点滴時間 | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--------------|------------|-------------------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 生理食塩液 250mL トラスツズマブ注※ | 1本 6mg/kg | メイン | 初回90分 2回目以降30分 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 生理食塩液 50mL | 1本 | メイン | フラッシュ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | カペシタビン錠 | 備考 参照 | 1日2回 内服 | | △ 夕 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ 朝 | | | | | | | |

※ HER初回 8mg/kg