

対象疾患名：乳がん

レジメン名：パージェタ + トラスツズマブ + パクリタキセル weekly療法

1コースの日数：21日

レジメン内容

| Rp | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 点滴時間 | Day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------|------|-------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1 | 生理食塩液 250mL パージェタ注 ^{※1} | 1本 420mg /body | メイン | 初回1時間 2回目以降30分 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 生理食塩液 50mL | 1本 | メイン | 15分 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生理食塩液 250mL トラスツズマブ注 ^{※2} | 1本 6mg/kg | メイン | 初回90分 2回目以降30分 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液 50mL | 1本 | メイン | フラッシュ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 生理食塩液 50mL ファモチジン注 20mg デキサート注 6.6mg | 1本 1A 1V | メイン | 10分 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 生理食塩液 100mL | 1本 | メイン | 30分 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ブドウ糖5% 250mL パクリタキセル注 ^{※3} | 1本 80mg/m ² | メイン | 1時間 | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 生理食塩液 50mL | 1本 | メイン | フラッシュ | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※1 PER初回 840mg/body

※2 HER初回 8mg/kg

※3 PTX投与30分前にレスタミン錠 5錠 内服