

対象疾患名：胆道がん/膵がん

レジメン名：S-1 + GEM (2W)療法

1コースの日数：14日

| | | |
|----|---------------------------|------------|
| 備考 | BSA < 1.20 m ² | : 80 mg/日 |
| | BSA ≥ 1.20 m ² | : 100 mg/日 |

レジメン内容

| Rp | 薬品名 | 投与量 | 投与方法 | 点滴時間 | Day | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------------------------|------------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|---|--------|----|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | YDソリタT3 200mL | 1本 | メイン | 1時間 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | グラニセロンバッグ 3mg デキサート注 1.65mg | 1本 2A | 側管 | 30分 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ブドウ糖5% 100mL ゲムシタピン注 | 1本 1000mg/ m ² | 側管 | 30分 | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生理食塩液 50mL | 1本 | 側管 | フラッシュ | ○ | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | エスワンタイホウ配合OD錠 | 備考 参照 | 1日2回 内服 | | △ タ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ 朝 | | | | | |